



COMUNE DI SOLIERA
Provincia di Modena

Piano per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della Chikungunya e della Dengue

IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta in data odierna dell'AUSL Modena con la quale si informa che all'interno dell'area definita dalle vie sotto riportate si è riscontrato un caso di febbre da virus Chikungunya;

AVVISA I RESIDENTI NELLE VIE SOTTO INDICATE

che sono previsti interventi di disinfestazione in aree pubbliche e private.

E' previsto anche il trattamento con prodotti adulticidi, mediante nebulizzazione.

GLI INTERVENTI NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE INDIVIDUATE SARANNO EFFETTUATI NEI GIORNI:

17 – 18 – 19 AGOSTO 2014 DALLE ORE 02:00 ALLE ORE 04:00 (INTERVENTI NOTTURNI)

Si richiede gentilmente di collaborare con gli addetti della Ditta Aernova srl, incaricata dal Comune. Gli stessi sono a disposizione per fornire assistenza, consigli e informazioni.

Zona di intervento:

<i>Via</i>
I Maggio (tratto compreso tra Via Grandi e Via della Pace)
Grandi (tratto compreso tra Via I Maggio e Via C.Menotti)
Via Ciro Menotti
Via Cavour
Via Rino Gaetano
Via Lucio Battisti
Via Ivan Graziani
Via Fabrizio De Andrè

Precauzioni da adottare

- Durante il trattamento restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio dell'aria
- Tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc) con teli di plastica.
- Prima del trattamento raccogliere eventualmente la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico.

In seguito al trattamento si raccomanda di :

- Rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con i prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso.
- Procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento
- In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

Nome della Ditta incaricata "Aernova srl"

Centrale Operativa Polizia Municipale

AUSL – DSP - Servizio Igiene Pubblica (in orario d'ufficio)

tel. 348 2621306

tel. 059 649555

tel. 059 659906

SCHEDE INFORMATIVA “ CHIKUNGUNYA “ E “ ZANZARA TIGRE”

La Chikungunya è una malattia di origine virale, causata da un virus della famiglia delle Togaviridae, trasmessa tramite la puntura di zanzara tigre. Bacino endemico della malattia sono diverse zone tropicali.

Sintomi e quadro clinico

La Chikungunya è una malattia tropicale, che in molte zone convive con la Dengue. Data una certa somiglianza dei sintomi, non è sempre facile distinguere le due malattie.

Dopo un periodo di incubazione di 3-12 giorni, si manifestano sintomi simili a quelli dell'influenza, con febbre alta, brividi, cefalea, nausea, vomito e soprattutto importanti dolori articolari (da cui deriva il nome chikungunya, che in lingua swahili significa "ciò che curva" o "contorce"), tali da limitare molto i movimenti dei pazienti che quindi tendono a rimanere assolutamente immobili e assumere posizioni che consentano di non sentire il dolore. In alcuni casi, si può sviluppare anche eruzione cutanea pruriginosa. Il tutto si risolve spontaneamente, in genere in pochi giorni, anche se i dolori articolari possono persistere anche per molti mesi.

Le complicanze più gravi sono rare e possono essere di natura emorragica (anche se non così gravi come nella Dengue) entro 3-5 giorni, o neurologica, soprattutto nei bambini.

In rarissimi casi la Chikungunya può essere fatale, più che altro in soggetti anziani che presentano già altre patologie di base.

Vettori e agente responsabile

Un importante vettore dell'infezione virale è *Aedes albopictus*, comunemente chiamata Zanzara Tigre, presente anche nei centri abitati del nostro paese. *Aedes aegypti* è un'altra specie vettore della diffusione di questo virus nelle zone endemiche.

Prevenzione e consigli

La prevenzione della malattia consiste innanzitutto nell'evitare o ridurre al minimo le punture delle zanzare.

Precauzioni generali per difendersi dalle punture delle zanzare:

- reti alle finestre o zanzariere nelle stanze in cui si soggiorna (meglio se impregnate con insetticidi)
- insetticidi per uso domestico
- vestiti che non lascino scoperte parti del corpo (camicie con maniche lunghe, pantaloni lunghi ecc) di colore chiaro, perché i colori scuri attraggono le zanzare
- repellenti sulle parti del corpo che rimangono scoperte, tenendo presente che il sudore ne riduce l'effetto.

Donne gravide e bambini dovrebbero consultare il proprio medico o farmacista prima di utilizzare questi prodotti, mentre particolare attenzione va posta ai bambini di età inferiore ai 3 mesi, per i quali l'utilizzo dei repellenti è sconsigliato. I repellenti di sintesi (tipo DEET) in forma di crema o spray sono efficaci contro la Zanzara Tigre, ma devono essere utilizzati con cautela.

E' importante ricordare che alcune zanzare vettori di questa malattia, come appunto la Zanzara Tigre, sono attive durante il giorno.

In caso di febbre di qualsiasi natura, soprattutto se accompagnata da dolori articolari, si raccomanda ai viaggiatori di rientro da una zona in cui è presente la malattia di segnalare al proprio medico, o alla struttura ospedaliera a cui si sono rivolti, i Paesi in cui si sono recati.

Per ulteriori informazioni: <http://www.zanzaratigreonline.it/>